



### Carte de dosage pour patient

**Coartem® / Riamet® traite le paludisme. Vous devez le prendre exactement selon les recommandations et pendant les 3 jours, sinon la maladie peut réapparaître.**

### POIDS CORPOREL



De 5 à moins de 15 kg




De 15 à moins de 25 kg



De 25 à moins de 35 kg



Adultes et enfants de 35 kg et plus



### Prenez la dose correcte au bon moment.

- Commencez le traitement immédiatement.
- Chaque dose de Coartem® / Riamet® doit être prise avec un aliment ou une boisson contenant une forte teneur en graisses (par exemple du lait).
- Pour les petits enfants, écrasez le comprimé avant de l'administrer.
- Si vous vomissez dans l'heure qui suit la prise de Coartem® / Riamet®, répétez la dose et



demandez des comprimés supplémentaires à votre pharmacien.

- **Assurez-vous que le traitement complet soit pris pendant les 3 jours et aux heures recommandées.**
- Prenez la première dose immédiatement et la deuxième dose huit heures après. Puis une dose le matin et une dose le soir pendant le deuxième et le troisième jour jusqu'à ce que l'emballage soit vide.

**Coartem® / Riamet® doit être remis avec la notice d'emballage comportant l'information complète sur la sécurité. Demandez la notice à votre médecin ou votre pharmacien si vous ne l'avez pas reçue.**



French

www.coartem.com