



Cartão de dosagem para o paciente

Como tomar o Coartem® para tratar a malária.

Deve tomá-lo exactamente como recomendado durante 3 dias completos, caso contrário a infecção poderá reaparecer.


PESO DO CORPO



5 a menos de 15 kg




15 a menos de 25 kg



25 a menos de 35 kg



Adultos e crianças com 35 kg ou mais



Tome a dose correcta à hora certa.

- Comece imediatamente o tratamento.
- Tome cada comprimido acompanhado de comida ou bebida com um elevado teor de gordura (por exemplo, leite).
- Para crianças pequenas, esmague o comprimido antes de o dar a tomar.
- Se vomitar no espaço de uma hora depois de tomar o Coartem®, repita a dose e obtenha mais comprimidos da farmácia.



- **Certifique-se de que faz o tratamento COMPLETO durante 3 dias, às horas recomendadas.**

- Tome a primeira dose imediatamente e a segunda dose 8 horas depois. Tome as restantes doses de manhã e à noite no segundo e terceiro dias, até acabar o pacote.

O Coartem® / Riamet® deve ser dado aos pacientes juntamente com o folheto da embalagem para uma informação de segurança completa. Peça o folheto ao seu médico ou farmacêutico se não o tiver recebido.

 **NOVARTIS** Novartis Pharma AG
CH-4002 Basel, Switzerland

Portuguese

www.coartem.com