




### Tarjeta de dosificación para el paciente

Coartem® / Riamet® para el tratamiento de la malaria.

**Debe de tomar la dosis exacta según las recomendaciones indicadas durante 3 días enteros, de lo contrario es posible que la infección se repita.**

**PESO CORPORAL**



De 5 a menos de 15 kg




De 15 a menos de 25 kg



De 25 a menos de 35 kg



Adultos y niños de 35 kg y más



**Tome la dosis correcta a la hora indicada.**

- Comience el tratamiento inmediatamente.
- Tome los comprimidos con alimentos o bebidas de alto contenido graso (por ejemplo leche).
- Para los niños pequeños aplaste los comprimidos antes de la administración.
- Si vomita dentro de 1 hora de haber tomado Coartem® / Riamet®, repita la dosis y adquiera más comprimidos en su farmacia.



- **Asegúrese de tomar el tratamiento durante los 3 días ENTEROS a las horas recomendadas.**

- Tome la primera dosis inmediatamente y la segunda 8 horas después. Tome las dosis restantes por la mañana y de nuevo por la noche, los días dos y tres, hasta terminar la caja.

**Coartem® / Riamet® debe darse al paciente junto con el prospecto incluido en el envase que contiene toda la información sobre seguridad. Pida a su médico o farmacéutico el prospecto incluido en el envase si no ha recibido uno.**



Spanish